À 200 ppm, la solution de **Comprimés MB-10^{MD}** est un virocide contre le VIH-1.
Les **Comprimés MB-10^{MD}** ont été conçus pour être utilisés dans les établissements où l'on trouve des animaux de laboratoire, les cliniques et les hôpitaux vétérinaires, les établissements où l'on élève et garde des animaux, les établissements de recherche et les laboratoires, ainsi que pour d'autres usages collectifs/industriels.
Le **Comprimés MB-10^{MD}** est un désinfectant efficace à utiliser sur les surfaces en contact avec de la nourriture.
Le **Comprimés MB-10^{MD}** peut être utilisé comme désinfectant général, ou pour les hôpitaux, sur les surfaces dures et non poreuses.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DE LA SOLUTION:
100 ppm de dioxyde de chlore (désinfectant pour les surfaces en contact avec des aliments et traitement contre les virus des animaux).
Dans un seau en plastique propre, mettre soit un (1) **Comprimés MB-10^{MD}** de 6,0 grammes ou quatre (4) **Comprimés MB-10^{MD}** de 1,5 gramme par 3,78 litres d'eau potable propre. Ou encore, dans un flacon pulvérisateur en plastique, mettre un (1) **Comprimés MB-10^{MD}** de 1,5 gramme par 950 ml d'eau potable propre Préparer la solution dans un endroit bien ventilé. Une fois le comprimé dissous, vous obtiendrez une solution de travail contenant **100 ppm** de dioxyde de chlore.

200 ppm de dioxyde de chlore (désinfectant pour les surfaces dures et non poreuses et traitement contre le VIH).
Dans un seau en plastique propre, mettre deux (2) **Comprimés MB-10^{MD}** de 6,0 grammes ou huit (8) **Comprimés MB-10^{MD}** de 1,5 gramme par 3,87 litres d'eau potable propre. Ou encore, dans un flacon pulvérisateur en plastique, mettre un (1) **Comprimés MB-10^{MD}** de 1,5 gramme par chopine (500 ml) d'eau potable propre. Préparer la solution dans un endroit bien ventilé. Une fois le comprimé dissous, vous obtiendrez une solution de travail contenant **200 ppm** de dioxyde de chlore. Préparer de la nouvelle solution chaque jour.

Les **Comprimés MB-10^{MD}**, lorsqu'ils sont activés par l'eau, produisent une solution de dioxyde de chlore (ClO2) efficace contre : le hantavirus, le virus minute de la souris (MVM), le virus de l'hépatite murine (MHV), l'orthopoxvirus simien de type 1 (OVS), le virus hémolytique du Japon (Sendai) et la sialodacryoadénite, à 200 ppm.

UTILISATION PAR LES VÉTÉRINAIRES : À utiliser sur les surfaces dures non poreuses suivantes : matériel, ustensiles, instruments, cages, chenils, écuries et chatteries. Retirer tous les animaux et la nourriture des locaux, véhicules de transport pour animaux, enclos, mues, cages, etc. Retirer la litière, les déchets, les excréments et le fumier qui se trouvent sur les planchers, les murs ou toute surface en contact avec des animaux. Nettoyer à fond toutes les surfaces avec du savon ou un détergent, puis, rincer à l'eau. Saturer les surfaces avec la solution préparée et laisser agir pendant 10 minutes. Bien aérer les bâtiments et les espaces fermés. Ne pas retourner les animaux dans le bâtiment ni utiliser l'équipement avant que la solution n'ait été absorbée, ait agi ou ait séché. Bien frotter les râteliers, mangeoires automatiques, abreuvoirs et autres équipements qui distribuent de la nourriture ou de l'eau, avec du savon ou un détergent, puis rincer à l'eau potable avant de réutiliser.

DÉSINFECTION DES SURFACES DURES NON POREUSES Avant d'utiliser le produit, il faut retirer tous les produits alimentaires et le matériel d'emballage. Appliquer la solution à 200 ppm sur les surfaces non poreuses avec un chiffon, une éponge, une vadrouille ou un vaporisateur mécanique. Si vous utilisez un vaporisateur mécanique, le jet doit être grossier. Tenir le contenant à 15 à 20 cm de la surface et vaporiser jusqu'à ce que celle-ci soit complètement trempée. La surface traitée doit demeurer trempée pendant 10 minutes avant que vous ne l'essuyiez. Pour les endroits très souillés, un prénettoyage s'impose. Le prénettoyage devrait être fait selon les directives de la section UTILISATION PAR LES VÉTÉRINAIRES. Rincer à l'eau potable après l'utilisation sur les surfaces en contact avec de la nourriture.

DÉSINFECTION DES SURFACES EN CONTACT AVEC DE LA NOURRITURE : Avant l'application, retirer les particules de nourriture et la saleté. Puis, laver à fond les objets avec un détergent et rincer à l'eau potable avant l'application de la solution désinfectante. Appliquer la solution à 100 ppm sur les surfaces dures non poreuses prénettoyées qui entrent en contact avec de la nourriture avec un chiffon, une éponge, une vadrouille ou un vaporisateur mécanique. Si vous utilisez un vaporisateur mécanique, le jet doit être grossier. Tenir le contenant à 15 à 20 cm de la surface et vaporiser jusqu'à ce que celle-ci soit complètement trempée. Lors de l'application avec un vaporisateur, couvrir ou retirer tous les produits alimentaires. La surface traitée doit demeurer trempée pendant 1 minute. Laisser sécher à l'air. Ne pas rincer. Désinfecter la vaisselle, l'argenterie, les verres, les ustensiles de cuisine et les autres articles semblables servant à manipuler de la nourriture en les immergeant.

Comprimés MB-10^{MD}

Comprimés Virucides / Assainisseur / Désinfectant Oxydants

Pour utilisation dans les résidences, établissements, industries, endroits où l'on trouve des animaux de laboratoire, cliniques et hôpitaux vétérinaires et autres établissements où l'on élève et garde des animaux.

Ingrédients actifs :

Chlorite de sodium . . . . . 20,8 %
Dichlorocyanurate de sodium dihydraté . . . . . 7,0 %
(apporte du dioxyde de chlore à la solution)

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

DIN # 02279673

POIDS NET : Comprimés de 1.5 gramme (150ch.) 225g (0.5lb)

Date limite d'utilisation: 04/23 Lot n^{o}: 20005

DANGER

CORROSIF **POISON**

Fabriqué pour :

Quip Laboratories, Inc.
1500 Eastlawn Avenue • Wilmington, DE 19802
TEL (302) 761-2600 • FAX (302) 761-2611
Distribué au Canada par :
Perotech Sciences Inc.
2 Select Avenue • Unit 7
Toronto, Ontario M1V 5J4
1-800-515-0089 • 416-332-8394

contains Aseptrol® Aseptrol et le logo d'Aseptrol sont des marques de commerce de BASF.

VIROCIDE CONTRE LE VIH : Appliquer la solution à 200 ppm sur les surfaces dures non poreuses comme les planchers, les murs, les comptoirs, les surfaces en acier inoxydable, les hottes de biosécurité, les éviers, les carreaux, etc. avec un chiffon, une éponge, une vadrouille ou un vaporisateur mécanique. Si vous utilisez un vaporisateur mécanique, le jet doit être grossier. Tenir le contenant à 15 à 20 cm (6 à 8 pouces) de la surface et vaporiser jusqu'à ce que celle-ci soit complètement trempée. La surface traitée doit demeurer trempée pendant 5 minutes avant que vous ne l'essuyiez. Pour les endroits très souillés, un prénettoyage s'impose. Le prénettoyage devrait être fait selon les directives de la section UTILISATION PAR LES VÉTÉRINAIRES. Rincer à l'eau potable après l'utilisation sur les surfaces en contact avec de la nourriture.

DIRECTIVES SPÉCIALES POUR LE NETTOYAGE ET LA DÉCONTAMINATION CONTRE LE VIH DES SURFACES ET DES OBJETS TACHÉS DE SANG OU DE FLUIDES CORPORELS pour les établissements de soins de santé ou autres endroits où il est probable que des objets ou des surfaces inanimés aient été souillés par du sang ou des fluides corporels, ce qui pourrait être associé à la transmission du VIH-1. Les **Comprimés MB-10^{MD}**, à une concentration de 200 ppm, détruisent le VIH-1 sur les surfaces et les objets prénettoyés préalablement tachés de sang ou d'autres fluides corporels en 1 minute.
PROTECTION PERSONNELLE : Le travailleur devrait porter des gants en latex jetables, une blouse, un masque et des lunettes de sécurité pour éviter d'être contaminé par les articles souillés.
PROCÉDURE DE NETTOYAGE : Les surfaces et les objets tachés de sang ou d'autres fluides corporels doivent être bien nettoyés avant l'application de la solution de **Comprimés MB-10^{MD}**.
TEMPS DE CONTACT : Laisser agir la solution de **Comprimés MB-10^{MD}** pendant 1 minute sur les articles traités. Ce temps de contact ne permet pas d'éliminer les autres types communs de virus et de bactéries.
ÉLIMINATION DU MATÉRIEL INFECTIEUX : Tout article taché de sang ou d'autres fluides corporels devrait être passé à l'autoclave puis jeté, conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et locaux concernant l'élimination des déchets infectieux.

PREMIERS SOINS

CONTACT AVEC LES YEUX : Tenir l'œil ouvert et rincer doucement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Retirer les verres de contact après les 5 premières minutes, puis, continuer à rincer. Téléphoner dans un centre antipoison ou à un médecin pour savoir quoi faire.
INGESTION : Téléphoner immédiatement dans un centre antipoison ou à un médecin pour savoir quoi faire. Si la personne est capable d'avaler, lui faire boire un verre d'eau. Ne pas provoquer de vomissement, à moins d'avoir obtenu l'avis contraire d'un médecin ou d'un conseiller du centre antipoison. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente.
CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : Retirer les vêtements contaminés. Rincer la peau immédiatement à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Téléphoner dans un centre antipoison ou à un médecin pour savoir quoi faire.
INHALATION : Faire respirer de l'air frais à la personne intoxiquée. Si la personne ne respire plus, appeler le 911 ou une ambulance, puis, pratiquer la respiration artificielle, préférablement le bouche-à-bouche. Téléphoner dans un centre antipoison pour savoir quoi faire. Avoir à portée de la main le contenant ou l'étiquette du produit au moment de téléphoner au centre antipoison ou au médecin, ou de faire traiter la personne.

NOTE AU MÉDECIN

En raison du dommage probable fait aux muqueuses, le lavage gastrique peut être contre-indiqué.

PRÉCAUTIONS

DANGER. Corrosif. Cause des affections oculaires et des brûlures cutanées irréversibles. L'absorption par voie cutanée peut être fatale. L'ingestion est dangereuse. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Porter un équipement de protection des yeux (lunettes étanches, masque protecteur ou lunettes de sécurité), des vêtements de protection et de gants de caoutchouc. Bien se laver avec de l'eau et du savon après avoir manipulé le produit et avant de manger, de boire ou de consommer du tabac. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

Pour éviter toute détérioration, entreposer ce produit dans un endroit frais et sec, loin des rayons directs du soleil et de la chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. Mettre le contenant et le sachet ou l'emballage-coque vide dans un sac de plastique et jeter aux ordures. Ne pas contaminer l'eau, les aliments ou les pâtures par l'entreposage ou l'élimination du produit.

Remarque : Le vendeur garantit que le produit correspond à sa description chimique. Il n'y a aucune garantie expresse ou implicite liée à la vente de ce produit incluant, sans s'y limiter, la garantie de bon fonctionnement pour un usage en particulier.